

Grandes cultures

Le 7 Juillet 1993

N° 7

BETTERAVES

Cercosporiose : Intervenir.

MAIS

Pyrale : Intervenir avant le 10/07.

Pucerons : A surveiller.

BETTERAVES**MALADIES**

✱ Situation

Plusieurs parcelles de la zone betteravière présentent déjà les premiers symptômes de Cercosporiose (ALLIER et PUY-DE-DOME). Les pluies orageuses lui sont très favorables.

✱ Préconisation

Visiter rapidement vos parcelles afin de repérer les taches éventuelles de cercosporiose (la fiche couleur jointe "Principales Maladies de la Betterave" vous aidera pour le diagnostic).

Une intervention fongicide doit être immédiate en utilisant un produit polyvalent, performant sur cercosporiose contenant un triazole seul comme flutriafol, difénococonazole, cyproconazole, flusilazole ou associé à un sel d'étain comme fentine hydroxyde et fentine acétate.

Consulter la fiche parue avec notre bulletin N° 6 (Sup. n° 1 du 16/06/93).

MAIS**PYRALE**

✱ Situation

- En cage d'élevage à MARMILHAT (63).

Les sorties sont importantes depuis le 24/06

- Piégeages sexuels :

Les captures sont significatives dans tous les postes.

POSTES	Cumul des captures
La Ferté-Hauterive (03)	31
St-Bonnet-de-Rochefort (03)	5
Espirat (63)	13
Saint-Babel (63)	25

✪ **Préconisation**

Confirmation du traitement avec les microgranulés à effectuer avant le 10/07.

PUCERONS

✪ **Situation**

Les infestations sont faibles.

✪ **Préconisation**

Aucune intervention ne se justifie.

*Maintenir une surveillance notamment pour l'espèce *Rhopalosiphum padi* au cours de la floraison du maïs. Ce puceron est identifiable par sa couleur vert clair à noire avec la base de l'abdomen couleur lie de vin.*

Seuil d'intervention : 1 panicule colonisé sur 2.